

ID:	=患者情報!B1			(CBDCA + PTX + BV) 療法				施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿						
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日	
疾患名	非扁平上皮性非小細胞肺癌				開始日	年	月	日	
クール	1	週 投与	2	週 休薬	診療科	呼吸器 (<input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科)			
	備考	4~6cycle			医師名				

重要 B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
 HBs抗原
 HBs抗体
 HBc抗体
 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策~浦添総合病院バージョン~』をご参照下さい。

適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line <input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line <input checked="" type="checkbox"/> 3rd Line以降	告知の有無	P S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済		
	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 進行 <input checked="" type="checkbox"/> 再発	身長	cm	体重	kg	体表面積	0.00

扁平上皮癌は除外。喀血の無い症例。

薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	外来化療加算	A
CBDCA AUC 6	mg/m ² mg/body	PTX 200	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body	へパシスマブ 15 (BV)	<input checked="" type="checkbox"/> mg/kg <input type="checkbox"/> mg/body	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 対象外

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
①	レスタミンコーク錠(10mg)	5錠	P.O	
②	デキサート注(3.3mg)	9.9mg	D.I.V	15分
	ファモチジン注(20mg)	20mg		
	生食液(50mL)	50mL		
③	グラニセロン点滴静注 (3mg/100mL)	1袋	D.I.V	30分
④	パクリタキセル注(PTX)	<input type="text"/> mg	D.I.V	3時間
	5%ブドウ糖液(250mL)	250mL		
⑤	カルボプラチン注(CBDCA)	<input type="text"/> mg	D.I.V	60分
	生食液(250mL)	250mL		
⑥	へパシスマブ注(BV) [アバステン]	<input type="text"/> mg	D.I.V	初回 90分 2回目以降 30分 ※問題なければ時間短縮
	生食液(100mL)	100mL		

Day 2 ~ 4 デキサート錠(4mg) 2錠/2x(朝・昼食後)

注意事項など

看護師の方々へ;パクリタキセル投与の際は必ずPVC点滴フリーセット、フィルターを使用して下さい。

過敏症防止のため、①~③の投与はパクリタキセル投与30分前までに済ませておくこと。

CBDCA+PTX+BV併用を4~6サイクル実施後、維持療法(maintenance)を行なう場合は別レジメンとして提出する必要があります。

Day	1Kur目			2Kur目		
	1	8	15	22	29	36 ...
CBDCA	↓			↓		
PTX	↓			↓		
BV	↓			↓		

	確認者	監査者