ID:	=患者情報!B1		
患者氏名	=患者情報!B2	殿	
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8

（ CDDP+5-FU（フルオロウラシル） 【通常 4週毎】 ） 療法

施行日	クール

入院/外来		入力日		年		月		日
疾患名		開始日		年		月		日
クール	4週毎（CDDP:Day1，フルオロウラシル：Day1～5）	診療科						
		医師名						

重要 B型肝炎の再活性化（de novo B型肝炎）対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

☐ HBs抗原
☐ HBs抗体
☐ HBc抗体

身長	cm	体重	kg	体表面積	0.00 m^2	告知の有無	
外来化療加算	☑ A ☐ B ☐ 対象外	PS		同意書取得	☐ 済		

薬品名	単位	薬品名	単位
シスプラチン 80 (CDDP)	☑ mg/m^2 ☐ mg/body	フルオロウラシル 800	☑ mg/m^2/日 ☐ mg/body

オーダー忘れずに！

メインルート　側管

第0日目（Chemo前日）

メイン D.I.V. （16:00）
ソルデム3A 1000 mL

第1日目（Chemo当日）

メイン① D.I.V. （7:00）
ソルデム3A 500 mL

メイン① → 250mL/hr → メイン② → 250mL/hr → メイン③ → 40mL/hr → メイン④ → 40mL/hr

メイン② D.I.V. （9:00）
シスプラチン注 mg
生食液 300 mL

メイン③ D.I.V. （11:00）
フルオロウラシル注 mg
ソルデム3A 500 mL

メイン④ D.I.V.
フルオロウラシル注 mg
ソルデム3A 500 mL

内服薬（制吐剤） 1日目
イメンドCap（125mg） 1Cap
※シスプラチン投与1時間～1時間30分前に服用

側管① → 15分 → 側管② → ワンショット → 側管③ → 80mL/hr → 側管④ → 80mL/hr

側管① D.I.V. （8:30）
デキサート注(3.3mg) 6.6 mg
アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/袋) 1 袋

側管② I.V. ※側管①終了時
フロセミド注(20mg) 20 mg

側管③ D.I.V. （11:00）
ソルデム3A 500 mL
フロセミド注(20mg) 20 mg

側管④ D.I.V. （17:30）
ハルトマン液 500 mL

第2日目（Chemo翌日）

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 mg
ソルデム3A 500 mL

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 mg
ソルデム3A 500 mL

内服薬（制吐剤） 2日目
イメンドCap（80mg） 1Cap
※午前中に投与すること

側管 D.I.V.(30分) （7:00）
デキサート注(3.3mg) 3.3 mg
生食液(100) 100 mL

側管 I.V. （朝食後）
フロセミド注(20mg) 20 mg

側管 D.I.V.(80mL/hr)
ハルトマン液 500 mL

側管 D.I.V.(80mL/hr)
ハルトマン液 500 mL

第3日目（Chemo翌々日）

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 mg
ソルデム3A 500 mL

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 mg
ソルデム3A 500 mL

内服薬（制吐剤） 3日目
イメンドCap（80mg） 1Cap
※午前中に投与すること

側管 D.I.V.(30分) （7:00）
デキサート注(3.3mg) 3.3 mg
生食液(100) 100 mL

第4，5日目（Chemo4，5日目）

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 mg
ソルデム3A 500 mL

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 mg
ソルデム3A 500 mL

側管 D.I.V.(30分) （7:00）
デキサート注(3.3mg) 3.3 mg
生食液(100) 100 mL

	1Kur目						2Kur目					
Day	1	2	3	4	5	・・・・	29	30	31	32	33	・・・
CDDP	↓						↓					
フルオロウラシル	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓	

注意事項など

確認者	監査者