

ID:	=患者情報!B1		(streptozin単独) 療法 【5日間連日】				施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2	殿					入院/外来	入力日
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7						
疾患名				開始日	年	月	日	
クール	5日投与37日休薬(6週間毎)			診療科				
				医師名				
適応基準	<input type="checkbox"/> 1st Line <input type="checkbox"/> 2nd Line <input type="checkbox"/> 3rd Line以降 <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 進行 <input type="checkbox"/> 再発			告知の有無	P S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済	
	身長		cm	体重		kg	体表面積 0.00 m ²	
重要	B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 <small>※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。</small>						<input type="checkbox"/> HBs抗原 <input type="checkbox"/> HBs抗体 <input type="checkbox"/> HBe抗体	
	薬品名	単位	減量基準および増量基準は無し [500mg/m ² のみ]	外来化療加算	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外			
streptozin	500	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body						
当院未採用薬のため、「緊急医薬品使用届」の提出が別途必要です。								
【お願い】 サンドスタチンLAR筋注と併用する場合は、消化管内分泌腫瘍(消化管NET):「オクトレオドLAR単独」の個人用レジメンを別途提出して下さい。								

【 Day1 】

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
①	イメンドCap(125mg)	1Cap	P.O	②と同時に投与
②	デキサート注(3.3mg)	9.9mg	D.I.V	15分
	アロキシ点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/袋)	1袋		
③	ソルデム3A(500mL)	500mL	D.I.V	2時間
④	streptozin注[ザノサー]		D.I.V	30分
	生食液(100mL)	100mL		
⑤	フロセミド注(20mg)		D.I.V	1時間
	ソルデム3A(200mL)	200mL		

【 Day2~5 】

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
【注意】イメンドCap(80)およびデカトロン錠(4)の服薬状況を確認				
①	ソルデム3A(500mL)	500mL	D.I.V	2時間
②	streptozin注[ザノサー]		D.I.V	30分
	生食液(100mL)	100mL		
③	フロセミド注(20mg)		D.I.V	1時間
	ソルデム3A(200mL)	200mL		

Day 2~5 イメンドCap(80mg) 1Cap/回 4日間 ※午前中に投与すること

Day 2~5 デカトロン錠(4mg) 2錠/2x(朝・昼食後) 4日間

重要な基本的注意・副作用

streptozin注[ザノサー]投与後はフラッシュを行い、同じ静注ラインでフロセミド注と同時注入は避けること

- 腎障害、●肝障害、●骨髄抑制、●耐糖能異常 ⇒ 投与開始前および投与中は定期的に検査を実施すること
- 錯乱および嗜眠 ⇒ 自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること

	1-①	1-②	1-③	1-④	1-⑤	2Kur目へ				確認者	監査者				
Day	1	2	3	4	5	6	7	42	43	44	45	...		
streptozin	↓	↓	↓	↓	↓	x	x		x	↓	↓	↓	...		

調製方法

ザノサー点滴静注用(1g)1Vlに対して生食液9.5mlを加え混和させた後、数分間静置すること。
 [溶液1mL中には100mgのstreptozinを含有する]
 保存剤が添加されていないため、溶解後は速やかに使用すること。

注意事項など