

ID:	=患者情報!B1			( <span style="color: red;">ET</span> [EPI+DTX] ) <span style="color: red;">療法</span>				施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿						
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来		入力日	年	月	日
疾患名						開始日	年	月	日
クール	1	週	投与	2	週	休薬	診療科		
	備考	週1回 4クール(8クールまで可)				医師名			
重要	B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗原	
								<input type="checkbox"/> HBs抗体	
							<input type="checkbox"/> HBc抗体		
身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00	m <sup>2</sup>	告知の有無
薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算		<input checked="" type="checkbox"/> A	P S		
EPI 60	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mg/body	DTX 60	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mg/body			<input type="checkbox"/> B			
							同意書取得	<input type="checkbox"/> 済	
レジメン内容									
順番	医薬品名			投与量	投与部位	投与スケジュール			
①	デキサート注 (3.3mg)			9.9mg	D.I.V	30分			
	グラニセロン点滴静注 (3mg/100mL)			1袋					
②	エピルピシン注 (EPI)			<input style="border: 2px solid black;" type="text"/> mg	D.I.V	15分			
	生食液 (50mL)			50mL					
③	ドセタキセル注 (DTX)			<input style="border: 2px solid black;" type="text"/> mg	D.I.V	1時間			
	生食液 (250mL)			250mL					
シンセロン錠 (8mg)      1錠/分1                      x 2TD テカトロン錠 (0.5mg)      6~8錠/分3~4                      x 2TD									
注意事項など								確認者	監査者