

ID:	=患者情報!B1			(トポテカン単独 [ノギテカン]) 療法	施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿			
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年 月 日

疾患名	小細胞肺癌			開始日	年 月 日	
クール	1	週 投与	2	週 休薬	診療科	呼吸器 (<input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科)
	備考	ノギテカン・・・Day1～5(5日連続)			医師名	

適応基準	<input type="checkbox"/> 1st Line <input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line <input checked="" type="checkbox"/> 3rd Line以降	告知の有無	P S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済
	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 進行 <input type="checkbox"/> 再発	身長	cm	体重	kg
		体表面積	0.00	m ²	

重要 B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。


薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外
ノギテカン 1.0 (トポテカンは外国名)	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body		<input type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body		<input type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body		

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
①	テキサート注(3.3mg)	6.6mg	D.I.V	15分
	生食液(50mL)	50mL		
②	ノギテカン注 [ハイカムチン]	mg	D.I.V	30分
	生食液(100mL)	100mL		

Day1～5 (5日連続) ... ①+②

ノギテカン(トポテカン): 軽度催吐性リスク
 トポテカンは外国での一般名称だが、国内ではトポテシとの混同を避けるため、ノギテカンを一般名称としている。



注意事項など

	確認者	監査者