

ID:					( <span style="color: red;">CBDCA + VP-16</span> ) <span style="color: red;">療法</span> [透析患者限定]				施行日	クール
患者氏名				殿						
年齢 性別					入院/外来		入力日	年	月	日
疾患名					開始日		年	月	日	
クール	1	週	投与	3	週	休薬	診療科	呼吸器 ( <input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科 )		
	備考	週2回(4週毎) CBDCA・・・Day1, VP-16・・・Day1, 3				医師名				
<b>重要</b>	B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。							<input type="checkbox"/>	HBs抗原	
								<input type="checkbox"/>	HBs抗体	
								<input type="checkbox"/>	HBc抗体	

身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00	m <sup>2</sup>	告知の有無	
薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算		<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外	P S			
CBDCA 300	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mg/body	VP-16 50	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mg/body				同意書 取得	<input type="checkbox"/>	済	

## レジメン内容


順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
①	デキサート注(3.3mg)	9.9mg	D.I.V	15分
	アロキン点滴静注パック <sup>®</sup> (0.75mg/50mL/袋)	1袋		
②	エトホシト注(VP-16)	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> mg	D.I.V	1時間 (③と同時投与)
	5%ブドウ糖液(100mL)	100mL		
③	カルボプラチン注(CBDCA)	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> mg	D.I.V	1時間 (②と同時投与)
	5%ブドウ糖液(100mL)	100mL		

Day1・・・①・②・③ ⇒ ②及び③は、透析2時間前より開始(1時間投与)し、投与終了1時間後より透析4時間実施。

Day3・・・②のみ⇒②は、透析2時間前より開始(1時間投与)し、投与終了1時間後より透析4時間実施。  
(Day3の制吐剤はデカロン錠内服およびDay1のパロセトロン注の遅発性嘔吐抑制効果にてフォローする)

抗がん剤が高濃度となるため、  
右記の投与経路より投与する。

投与経路の選択



- シャント  
 中心静脈

Day 2 ~ 4 デカロン錠(4mg) 2錠/2x(朝・昼食後)

### 注意事項など

薬剤部での混注開始時間は、平日8時30分からとなります。

	1Kur目				2Kur目				確認者	監査者
	Day	1	2	3	.....	29	30	31		
CBDCA		↓				↓				
VP-16		↓	↓			↓	↓			