

ID:	=患者情報!B1			(TS-1 + DTX) 療法				施行日	クール	
患者氏名	=患者情報!B2		殿							
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日		
疾患名					開始日	年	月	日		
クール	週	投与	週	休薬	診療科					
	備考	TS-1:2週投与1週休薬 DTX :Day1			医師名					
身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00	m ²	告知の有無	
薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算	<input checked="" type="checkbox"/> A	P S				
TS-1 80	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body	DTX 40	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body		<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外		同意書 取得	<input type="checkbox"/> 済		
重要	B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗原		
	※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗体		
								<input type="checkbox"/> HBc抗体		
レジメン内容										
順番	医薬品名		投与量	投与部位		投与スケジュール				
①	デキサート注 (3.3mg)		6.6mg	D.I.V		30分				
	グラニセロン点滴静注 (3mg/100mL)		1袋							
②	ドセタキセル注 (DTX)		<input style="border: 2px solid black;" type="text"/> mg	D.I.V		60分				
	5%ブドウ糖液(250mL)		250mL							
内服	TS-1		mg/2x	P.O		1回	<input style="border: 2px solid black;" type="text"/>	mg		
注意事項など							確認者	監査者		