ID:	=患者情報!B1			施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2	殿	（【4週毎】CBDCA + Weekly PTX）療法		
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8		

入院/外来		入力日		年		月		日
疾患名	肛門管癌	開始日		年		月		日
クール	4週毎　カルボプラチン：Day1 パクリタキセル　：Day1，8，15	診療科						
備考		医師名						

重要　B型肝炎の再活性化（de novo B型肝炎）対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

☐ HBs抗原
☐ HBs抗体
☐ HBc抗体

身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00	m^2	告知の有無	

薬品名	単位	薬品名	単位	外来化療加算		P S	
CBDCA AUC 5	mg/m^2 mg/body	PTX 80	☑ mg/m^2 ☐ mg/body	☑ A ☐ B ☐ 対象外		同意書取得	☐ 済

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
Day1				
①	レスタミンコーワ錠（10mg）	5錠	P.O	
②	デキサート注（3.3mg）	9.9mg	D.I.V	15分
	ファモチジン注（20mg）	20mg		
	生食液（50mL）	50mL		
③	グラニセトロン点滴静注（3mg/100mL）	1袋	D.I.V	30分
④	パクリタキセル注（PTX）	mg	D.I.V	1時間
	5%ブドウ糖液（250mL）	250mL		
⑤	カルボプラチン注（CBDCA）	mg	D.I.V	60分
	生食液（250mL）	250mL		
Day8、15				
①´	レスタミンコーワ錠（10mg）	5錠	P.O	
②´	デキサート注（3.3mg）	6.6mg	D.I.V	15分
	ファモチジン注（20mg）	20mg		
	生食液（50mL）	50mL		
③´	パクリタキセル注（PTX）	mg	D.I.V	1時間
	5%ブドウ糖液（250mL）	250mL		

Day 2 ～ 4　デカドロン錠（4mg）　2錠/2x（朝・昼食後）【Day8,Day15は不要】

注意事項など

薬剤師へ：パクリタキセル混注の際は必ずフィルター付きプライミングセットを使用して下さい。

	1-①	1-②	1-③		2-①	2-②	2-③		3-①	3-②	
Day	1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	・・・・・・・・・
カルボプラチン	↓				↓				↓		・・・・・・・・・
パクリタキセル	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	・・・・・・・・・

確認者	監査者