

**ポリファーマシー:多くの薬剤を服用することで、副作用などの**有害事象**を引き起こすこと**

- ⇒ 不必要な薬剤があつたり、薬剤の重複など生じやす
- ⇒ 副作用だけでなく、薬剤費や、残薬(飲み忘れ)が増えるなど、様々な問題を引き起こしま

す

⇒ **不必要な薬剤の処方見直しを行い、患者さんの利益につなげる！！**



**2019年4月～医師と連携し、ポリファーマシー対策を開始**  
**2019年6月～薬剤総合評価調整加算 取得開始**

当院薬剤部では、2019年6月より、診療科の先生と情報交換を行いながら、入院患者様の薬剤調整(主に減薬)を積極的に行っています。

### 多職種カンファレンス



### 病棟担当薬剤師



担当医師と一緒に、お薬の必要性や副作用発現の有無などを話し合います。

お薬を減らすことができた場合には、患者様への説明・かかりつけ病院への薬剤情報提供を行っています。

入院患者様の減薬件数  
(薬評価剤総合調整加算取得件数)

2019年6月	7月	8月	9月	10月
3件	6件	6件	2件	5件

※2019年11月現在



# 実際の症例を用いてクイズ形式の勉強会を開催しました♪

## 薬剤総合調整加算の対象？非対象？

持参薬処方 (識別日: 2019.10.14)

退院処方

継続: 49日分 (処方日: 2019.09.01)

マグミット錠330mg	1回1錠	毎食後
グリマック配合顆粒	1回1包	毎食後
トアラセット配合錠	1回1錠	毎食後
リマプロストアルファデクス5μg	1回1錠	毎食後
ダントリウムカプセル25mg	1回1錠	毎食後
シンバスタテン5mg	1回1錠	朝食後
ランソプラゾールOD錠15mg	1回1錠	夕食後
ツムラ68芍薬甘草湯	1回1包	毎食前
ゾルピデム塩酸塩錠5mg	1回1錠	不眠時
テルピナフィン塩酸塩クリーム1%	塗布1日1回	
ニトラゼンローション2%	塗布1日1回	
シロドシンOD錠4mg	1回1錠	朝夕食後
テルピナフィン125mg	1回1錠	朝食後
パンテチン100mg	1回2錠	毎食後
マグミット錠500mg	1回1錠	便秘時

酸化マグネシウム500mg	1回1錠	朝夕食後
トアラセット配合錠	1回1錠	朝食後
リマプロストアルファデクス5μg	1回1錠	毎食後
ダントリウムカプセル25mg	1回1錠	毎食後
ネキシウムCP20mg	1回1錠	夕食後
ユリーフ錠4mg	1回1錠	朝夕食後
テルピナフィン125mg	1回1錠	朝食後
パンテチン100mg	1回2錠	毎食後
トラゼンタ錠5mg	1回1錠	朝食後
アモキシシリンカプセル250mg	1回2cp	毎食後

処方日数不明



ポリファーマシーチームを筆頭に  
減薬に向けて頑張っています！

# 医師との症例検討会

