

ID:	=患者情報!B1			(イリテカン単独) 療法					施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿						入院/外来	入力日
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	開始日	年	月	日			
疾患名					診療科					
クール	4	週	投与	2	週	休薬	医師名			
	備考					医師名				
身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00	m ²	告知の有無	
薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算		<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外		P S		
CPT-11 100	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body		<input type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body	同意書取得		<input type="checkbox"/> 済				

重要	B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗原
	※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗体
								<input type="checkbox"/> HBc抗体

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
①	デキサート注(3.3mg)	6.6mg	D.I.V	15分
	アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/袋)	1袋		
②	イリテカン注(CPT-11) [カプト]	<div style="border: 2px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> mg	D.I.V	90分
	5%ブドウ糖液(250mL)	250mL		

Day 2 & 3 デキサロン錠(4mg) 2錠/2x(朝・昼食後)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">1Kur目</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2Kur目</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Day 1 8 15 22 29 36 43</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">イリテカン ↓ ↓ ↓ ↓ ... ↓</td> <td></td> </tr> </table>	1Kur目	2Kur目	Day 1 8 15 22 29 36 43		イリテカン ↓ ↓ ↓ ↓ ... ↓		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">確認者</td> <td style="background-color: #d9ead3;">監査者</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	確認者	監査者		
1Kur目	2Kur目										
Day 1 8 15 22 29 36 43											
イリテカン ↓ ↓ ↓ ↓ ... ↓											
確認者	監査者										

注意事項など