

ID:	=患者情報!B1			(ブリグチニブ単独 [アルンブリグ]) 療法				施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿						
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日	
疾患名	非小細胞肺癌			開始日	年	月	日		
クール	週	投与	週	休薬	診療科				
	備考	連日投与			医師名				
適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line <input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line <input type="checkbox"/> 3rd Line以降 <input type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 進行 <input checked="" type="checkbox"/> 再発 <input checked="" type="checkbox"/> ALK融合遺伝子陽性			告知の有無		P S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済	
	身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00 m ²	

重要	B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。						<input type="checkbox"/> HBs抗原
							<input type="checkbox"/> HBs抗体
						<input type="checkbox"/> HBc抗体	

薬品名	day1-7	→	day8以降	外来 化療 加算	<input type="checkbox"/> A
ブリグチニブ	90mg/body		180mg/body		<input type="checkbox"/> B
					<input checked="" type="checkbox"/> 対象外

アルンブリグ錠は当院未採用薬のため、「緊急医薬品使用届」の提出が別途必要です。

レジメン内容

初期投与: day1-7 連日服用			
<input type="checkbox"/> 通常量	アルンブリグ錠90mg	1回1錠(90mg)	1日1回
<input type="checkbox"/> 減量	アルンブリグ錠30mg	1回2錠(60mg)	1日1回
<input type="checkbox"/> 減量	アルンブリグ錠30mg	1回1錠(30mg)	1日1回

↓

維持投与: day8以降 連日服用			
<input type="checkbox"/> 通常量	アルンブリグ錠90mg	1回2錠(180mg)	1日1回
<input type="checkbox"/> 1段階減量	アルンブリグ錠90mg	1回1錠	(120mg) 1日1回
	アルンブリグ錠30mg	1回1錠	
<input type="checkbox"/> 2段階減量	アルンブリグ錠90mg	1回1錠(90mg)	1日1回
<input type="checkbox"/> 3段階減量	アルンブリグ錠30mg	1回2錠(60mg)	1日1回

【用法用量に関する注意】

- ・1回90mgを超える投与量の維持投与期間に14日間以上休薬して再開する場合
→7日間(day1-7)の初期投与を実施する事
- ・3段階減量でも忍容性が認められない場合には、投与を中止する事

Day 1 7	初期投与量	維持投与量	確認者	監査者
ブリグチニブ ↓ ↓				

注意事項など