

ID:	=患者情報!B1			（ハーセプチン + XP [アロカリス点滴静注使用]） 療法				施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2 殿							入院/外来	入力日
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	開始日	年	月	日		
疾患名					診療科				
クール	カペシタビン ... 2週投与1週休薬 <small>(セローダ錠)</small> CDDP (シスプラチン注) Day1 トラスツマブ (ハーセプチン注) ... Day1				医師名				
適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line <input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line <input checked="" type="checkbox"/> 3rd Line以降 <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 進行 <input checked="" type="checkbox"/> 再発 <input checked="" type="checkbox"/> HER2過剰発現が確認された症例				告知の有無	P S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済	
	身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00 m ²	
重要	B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、 全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 <small>※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。</small>							<input type="checkbox"/> HBs抗原 <input type="checkbox"/> HBs抗体 <input type="checkbox"/> HBc抗体	
薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外
トラスツマブ 初回 8	<input checked="" type="checkbox"/> mg/kg <input type="checkbox"/> mg/body	トラスツマブ 2回目以降 6	<input checked="" type="checkbox"/> mg/kg <input type="checkbox"/> mg/body	CDDP 80	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body	カペシタビン 1日 2,000	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body		
※副作用等の理由にてトラスツマブの投与予定日より1週間を超えた場合は、初回投与量の8mg/kgで投与することが望ましい。									

第0日目 (Chemo前日)	
メイン (午後) D.I.V.	ソルデム3A(500) 1000 mL
第1日目 (Chemo当日)	
メイン (早朝) D.I.V.	ソルデム3A(500) 500 mL
メイン D.I.V.	初回のみ (8mg/kg)
トラスツマブ注	<input type="text"/> mg
【先:ハーセプチン注】	
注射用水 (20mL)	1~2 A
生食液 (250)	250 mL
2回目以降 (6mg/kg)	
トラスツマブ注	<input type="text"/> mg
【先:ハーセプチン注】	
注射用水 (20mL)	1~2 A
生食液 (250)	250 mL
メイン D.I.V.	
デキサト注(3.3mg)	6.6 mg
グラニトロン点滴静注 (3mg/100mL)	1 袋
アロカリス点滴静注 (235)	1 V
メイン D.I.V.	
シスプラチン (CDDP)	<input type="text"/> mg
生食液 (500)	300 mL
メイン D.I.V.	
ソルデム3A(500)	500 mL
フロセド注(20mg)	10 mg
メイン D.I.V.	
ソルデム3A(500)	500 mL
フロセド注(20mg)	10 mg
メイン D.I.V.	
ソルデム3A(500)	500 mL

メインルート
メイン

カペシタビン...1日の服用量 [セローダ錠] <input type="text"/> mg / 分 2

側管	側管 (9:00) I.V.	フロセド注(20mg) <input type="text"/> mg
----	----------------	-------------------------------------

※尿量2000mL以下でラシックス注10~20mg I.V.

【備考欄】	
--------------	--

第2日目 (Chemo翌日)	
メイン D.I.V. (100mL/hr)	側管 D.I.V. (30分)
ソルデム3A (500) 1500 mL	デキサト注(3.3mg) 3.3 mg
	生食液(100) 100 mL
※メイン終了後、ヘパロック	側管(朝食後) I.V.
	フロセド注(20mg) 20 mg

第3日目 (Chemo翌々日)	
メイン D.I.V. (100mL/hr)	側管 D.I.V. (30分)
ソルデム3A (500) 1000 mL	デキサト注(3.3mg) 3.3 mg
	生食液(100) 100 mL
※メイン終了後、ヘパロック	

1Kur目	2Kur目	3Kur目	確認者	監査者
Day 1 14 15	22 35 36	43		
カペシタビン ↓	↓	↓		
CDDP ↓	↓	↓		
トラスツマブ ↓	↓	↓		

