TS-1 + CDDP（［アロカリス点滴静注使用］）療法

ID:	=患者情報!B1	施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2 殿		
年齢 性別	=患者情報!B6 =患者情報!B7 =患者情報!B8		

入院/外来		入力日		年		月		日
疾患名		開始日		年		月		日
クール	週 投与 週 休薬	診療科						
備考	TS-1･･･3週投与2週休薬 CDDP･･･Day8	医師名						
適応基準	☐ 1st Line ☐ 2nd Line ☐ 3rd Line以降 ☐ 術前 ☐ 術後補助 ☑ 進行 ☑ 再発 ☐	告知の有無		P S		同意書取得	☐ 済	
		身長	cm	体重	kg	体表面積	0.00	m^2

重要

B型肝炎の再活性化（de novo B型肝炎）対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。

※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

☐ HBs抗原
☐ HBs抗体
☐ HBc抗体

薬品名	単位	薬品名	単位
TS-1 80	☑ mg/m^2 ☐ mg/body	CDDP 60	☑ mg/m^2 ☐ mg/body

TS-1･･･1日の服用量

[ ] mg / 分 2

外来化療加算 ☑ A ☐ B ☐ 対象外

オーダー忘れずに！

第7日目（Chemo前日）

メイン（午後） D.I.V.
ソルデム3A(500) 1000 mL

第8日目（Chemo当日）

メイン（早朝） D.I.V.
ソルデム3A(500) 500 mL

メイン（9:00） D.I.V.
デキサート注(3.3mg) 6.6 mg
グラニセトロン点滴静注(3mg/100mL) 1 袋
アロカリス点滴静注(235mg) 1 V

メイン（9:30） D.I.V.
シスプラチン(CDDP) [ ] mg
生食液(500) 300 mL

メイン（12:00） D.I.V.
ソルデム3A(500) 500 mL
フロセミド注(20mg) 10 mg

メイン D.I.V.
ソルデム3A(500) 500 mL
フロセミド注(20mg) 10 mg

メイン D.I.V.
ソルデム3A(500) 500 mL

メインルート

メイン → 100mL/hr → メイン → 100mL/hr → メイン → 30分 → メイン → 200mL/hr → メイン → 120mL/hr → メイン → 120mL/hr → メイン → 120mL/hr

側管 ワンショット

側管（9:00） I.V.
フロセミド注(20mg) [ ] mg

※尿量2000mL以下でラシックス注10～20mg I.V.

【備考欄】

第9日目（Chemo翌日）

メイン D.I.V.(100mL/hr)
ソルデム3A (500) 1500 mL

※メイン終了後、ヘパロック

側管（7:00） D.I.V.(30分)
デキサート注(3.3mg) 3.3 mg
生食液(100) 100 mL

側管（朝食後） I.V.
フロセミド注(20mg) 20 mg

第10日目（Chemo翌々日）

メイン D.I.V.(100mL/hr)
ソルデム3A (500) 1000 mL

※メイン終了後、ヘパロック

側管（7:00） D.I.V.(30分)
デキサート注(3.3mg) 3.3 mg
生食液(100) 100 mL

	1Kur目					2Kur目				
Day	1	･･･	8	･･････	21	22	36	･･･	43	･･････ 56 57
TS-1	↓	･･････			↓		↓	･･････		↓
CDDP		↓						↓		

確認者		監査者	