

ID:	=患者情報!B1			【6週毎】キイトルーダ単 独 療法 〔ペムブリスマブ〕	施行日		クール	
患者氏名	=患者情報!B2		殿					
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日
疾患名	PD-L1陽性の非小細胞肺癌			開始日	年	月	日	
	【注意】EGFR遺伝子変異陽性又は、ALK遺伝子陽性の化学療法未治療患者には推奨されていない			診療科				
クール	備考	6週ごと		医師名				

重要 B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
 HBs抗原
 HBs抗体
 HBc抗体
 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line	<input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line	<input checked="" type="checkbox"/> 3rd Line以降	告知の有無		P S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済		
	<input type="checkbox"/> 術前	<input type="checkbox"/> 術後補助	<input checked="" type="checkbox"/> 進行	<input checked="" type="checkbox"/> 再発	身長	cm	体重	kg	体表面積	0.00
薬品名	単位	外来化療加算		<input checked="" type="checkbox"/> A	製薬会社へのFAX登録 (申請医師にて対応) ※事後登録は不可				<input type="checkbox"/> 済	
ペムブリスマブ 400	<input type="checkbox"/> mg/kg <input checked="" type="checkbox"/> mg/body	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外								

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
①	ペムブリスマブ注 〔キイトルーダ〕	400 mg	D.I.V	30分
	生食液(50mL)	50 mL		

※希釈後の最終濃度は、1～10mg/mLとすること (参考: 400mg/50mL=8mg/mL)

【薬剤師の皆さんへ】プライミング時にはインラインフィルターを必ず使用して下さい。

1Kur目	2Kur目	確認者	監査者
Day 1 8 15 43 50 57 ...			
ペムブリスマブ ↓	↓		

注意事項など