

ID:	=患者情報!B1			<b>( トポテカン単独 [ノギテカン] ) 療法</b>	施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿			

年齢性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日
------	----------	----------	----------	-------	-----	---	---	---

疾患名	小細胞肺癌			開始日	年	月	日
-----	-------	--	--	-----	---	---	---

クール	1	週	投与	2	週	休薬	診療科	呼吸器 ( <input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科 )	
	備考	ノギテカン・・・Day1～5(5日連続)				医師名			

適応基準	<input type="checkbox"/> 1st Line	<input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line	<input checked="" type="checkbox"/> 3rd Line以降	告知の有無		P S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済		
	<input type="checkbox"/> 術前	<input type="checkbox"/> 術後補助	<input type="checkbox"/> 進行	<input type="checkbox"/> 再発	身長	cm	体重	kg	体表面積	0.00

**重要** B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、**全例スクリーニング対象**となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。  
 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。


薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	外来化療加算
ノギテカン 1.0	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup>					<input checked="" type="checkbox"/> A
(トポテカンは外国名)	<input type="checkbox"/> mg/body					<input type="checkbox"/> B
						<input type="checkbox"/> 対象外

## レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
①	デキサート注 (3.3mg)	6.6mg	D.I.V	15分
	生食液 (50mL)	50mL		
②	ノギテカン注 [ハイカムチン]	<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">          </span> mg	D.I.V	30分
	生食液 (100mL)	100mL		

**Day1～5 (5日連続) … ①+②**

ノギテカン(トポテカン): 軽度催吐性リスク  
 トポテカンは外国での一般名称だが、国内ではトポテシンとの混同を避けるため、ノギテカンを一般名称としている。



**注意事項など**

	確認者	監査者