

ID:	=患者情報!B1			(TS-1 + GEM 【day8,15】) 療法				施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿						
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日	

疾患名	膵臓癌			開始日	年	月	日	
クール	過投与	過休薬	診療科					
備考	TS-1:2週投与1週休薬 GEM:Day 8,15			医師名				

適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line	<input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line	<input checked="" type="checkbox"/> 3rd Line以降	告知の有無	P	S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済		
	<input checked="" type="checkbox"/> 術前	<input type="checkbox"/> 術後補助	<input checked="" type="checkbox"/> 進行	<input checked="" type="checkbox"/> 再発	身長	cm	体重	kg	体表面積	0.00

術前の場合、原則2クール施行後に手術を行う

重要	B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗原
	※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗体
								<input type="checkbox"/> HBc抗体

薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	外来化療加算
TS-1 60	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² /day <input type="checkbox"/> mg/body	GEM 1000	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
①	デキサート注(3.3mg)	6.6mg	D.I.V	30分
	グラニセロン点滴静注(3mg/100mL)	1袋		
②	ゲムシタピン注(GEM)	mg	D.I.V	200mL/hr(30分)
	5%ブドウ糖液(100mL)	100mL		

内服	TS-1	mg/2x	P.O	1回	mg
----	------	-------	-----	----	----

<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="4">1Kur目</th> <th colspan="4">2Kur目</th> </tr> <tr> <td>Day</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>14 15</td> <td>22</td> <td>29</td> <td>35</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>GEM</td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> </table>		1Kur目				2Kur目				Day	1	8	14 15	22	29	35	36	TS-1	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	GEM		↓	↓	↓	↓	↓	↓	確認者	監査者
1Kur目				2Kur目																															
Day	1	8	14 15	22	29	35	36																												
TS-1	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																												
GEM		↓	↓	↓	↓	↓	↓																												

注意事項など
 2020年8月の委員会にて、術前化学療法とGEMの投与日を整理するためにGEM投与day1, 8に整理。
 2022年4月に、外科の亀山医師からの要望によりGEM投与day8, 15の使用依頼あり(TS-1の副作用を1週目で確認する目的で必要)
 2022年11月に、外科の亀山医師からの要望により、TS-1の投与単位を「mg/m²/day」に変更