

ID:	=患者情報!B1		【2剤併用】 (セツキシマブ+エンコラフェニブ) 療法				施行日	クール	
患者氏名	=患者情報!B2 殿						入院/外来	入力日	年
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	開始日	年	月	日		
疾患名	切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			開始日	年	月	日		
クール	セツキシマブ:毎週投与(週1回) エンコラフェニブ、ピニメチニブ:連日内服			診療科					
適応基準	<input type="checkbox"/> 1st Line <input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line <input checked="" type="checkbox"/> 3rd Line <input checked="" type="checkbox"/> BRAF変異遺伝子陽性 <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 進行 <input checked="" type="checkbox"/> 再発			医師名					
重要	B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、 全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 <small>※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。</small>						<input type="checkbox"/> HBs抗原		
							<input type="checkbox"/> HBs抗体		
						<input type="checkbox"/> HBc抗体			
身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00 m ²	告知の有無	
薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算		<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外	P S		
セツキシマブ 初回 400	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body	セツキシマブ 2回目以降 250	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body				同意書 取得	<input type="checkbox"/> 済	
ビラフトピカプセルは当院未採用薬のため「緊急医薬品使用届」の提出が必要です。									
レジメン内容									
投与経路 内服									
設定	医薬品名	投与量、投与スケジュール		設定	医薬品名	投与量	投与スケジュール		
順番	医薬品名	投与量		投与経路	投与スケジュール				
<input type="checkbox"/> 通常量	ビラフトピカプセル [エンコラフェニブ]	300mg/1x		P.O	1回 300mg (75mg × 4Cap)				
<input type="checkbox"/> 1段階減量	ビラフトピカプセル [エンコラフェニブ]	225mg/1x		P.O	1回 225mg (75mg × 3Cap)				
<input type="checkbox"/> 2段階減量	ビラフトピカプセル [エンコラフェニブ]	150mg/1x		P.O	1回 150mg (75mg × 2Cap)				
<input type="checkbox"/> 3段階減量	ビラフトピカプセル [エンコラフェニブ]	投与中止							
該当する内容に <input checked="" type="checkbox"/> を入れて下さい。									
順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール					
初回のみ(1)									
①	レスタミンコ-7錠(10mg)	5錠	P.O	セツキシマブ投与30分前までに 内服					
②	デキサート注(3.3mg) 生食液(50mL)	6.6mg 50mL	D.I.V	15分					
③	セツキシマブ注 [ア-ビ-タックス] 生食液(500mL)	 mg 500mL	D.I.V	2時間					
④	生食液(100mL)	100mL	D.I.V	経過観察(1時間)					
2回目以降(2)									
①	レスタミンコ-7錠(10mg)	5錠	P.O	セツキシマブ投与30分前までに 内服					
②'	デキサート注(3.3mg) 生食液(50mL)	3.3mg 50mL	D.I.V	15分					
③'	セツキシマブ注 [ア-ビ-タックス] 生食液(250mL)	 mg 250mL	D.I.V	1時間					
④	生食液(100mL)	100mL	D.I.V	経過観察(1時間)					
注意事項など							確認者	監査者	
2回目以降のデキサート注は3.3mgに減量し、状態を見て省略可とする。									
(1) (2) (2) ...									
Day 1 Day 8 Day 15 ...									