| ID: | =患者情報!B1 |
|---|---|
| 患者氏名 | =患者情報!B2 殿 |
| 年齢 性別 | =患者情報!B6 =患者情報!B7 =患者情報!B8 |

# （ DTX＋CDDP+5-FU 【bDCF】 ）療法

| 施行日 | クール |
|---|---|
| | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院/外来 | | 入力日 | | 年 | | 月 | 日 |
| 疾患名 | 食道癌 | 開始日 | | 年 | | 月 | 日 |
| クール | DTX：Day1、15<br>CDDP:Day1<br>フルオロウラシル：Day1～5 | 診療科 | | | | | |
| | | 医師名 | | | | | |

**重要** B型肝炎の再活性化（de novo B型肝炎）対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

☐ HBs抗原
☐ HBs抗体
☐ HBc抗体

同意書取得 ☐ 済
告知の有無

| 身長 | | cm | 体重 | | kg | 体表面積 | 0.00 | $m^2$ | P S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

外来化療加算 ☐ A ☐ B ☐ 対象外

| 薬品名 | 単位 | 薬品名 | 単位 | 薬品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ（DTX） 30 | mg/m2 | ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ(CDDP) 80 | mg/m2 | フルオロウラシル 800 | mg/$m^2$/日 |

メインルート　側管

**第0日目（Chemo前日）**

オーダー忘れずに！

メイン D.I.V.
ソルデム3A 1000 mL

メイン 100mL/hr

**第1日目（Chemo当日）**

メイン① D.I.V.
ソルデム3A 500 mL

メイン 250mL/hr

メイン D.I.V.
アロカリス点滴静注(235mg) 1V
ﾃﾞｷｻｰﾄ注(3.3mg) 9.9mg
アロキシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ(0.75mg/50mL/袋) 1袋

メイン 30分

メイン .I.V.
フロセミド注(20mg) 20 mg

メイン ワンショット

メイン D.I.V.
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ注 [ ] mg
生食液(250mL) 250 mL

メイン 250mL/hr

メイン D.I.V.
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 [ ] mg
生食液 300 mL

メイン 250mL/hr

メイン D.I.V.
フルオロウラシル注 [ ] mg
ソルデム3A 500 mL

メイン 40mL/hr

側管 80mL/hr

側管 D.I.V.
ソルデム3A 500 mL
フロセミド注(20mg) 20 mg

側管 D.I.V.
ハルトマン液 500 mL

メイン D.I.V.
フルオロウラシル注 [ ] mg
ソルデム3A 500 mL

メイン 40mL/hr

側管 80mL/hr

**第2日目（Chemo翌日）**

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 [ ] mg
ソルデム3A 500 mL

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 [ ] mg
ソルデム3A 500 mL

※午前中に投与すること

側管 D.I.V.(30分) (7:00)
ﾃﾞｷｻｰﾄ注(3.3mg) 3.3 mg
生食液(100) 100 mL

側管 I.V. (朝食後)
フロセミド注(20mg) 20 mg

側管 D.I.V.(80mL/hr)
ハルトマン液 500 mL

側管 D.I.V.(80mL/hr)
ハルトマン液 500 mL

**第3日目（Chemo翌々日）**

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 [ ] mg
ソルデム3A 500 mL

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 [ ] mg
ソルデム3A 500 mL

※午前中に投与すること

側管 D.I.V.(30分) (7:00)
ﾃﾞｷｻｰﾄ注(3.3mg) 3.3 mg
生食液(100) 100 mL

**第4，5日目（Chemo4，5日目）**

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 [ ] mg
ソルデム3A 500 mL

メイン D.I.V.(40mL/hr)
フルオロウラシル注 [ ] mg
ソルデム3A 500 mL

側管 D.I.V.(30分) (7:00)
ﾃﾞｷｻｰﾄ注(3.3mg) 3.3 mg
生食液(100) 100 mL

| | 1Kur目 | | | | | | | | 2Kur目 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ····· | 15 | ····· | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| DTX | ↓ | | | | | | ↓ | | ↓ | | | | |
| CDDP | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | |
| フルオロウラシル | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

## Day15（DTX単剤）：①’ ＋ メイン②

| 順番 | 医薬品名 | 投与量 | 投与部位 | 投与スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| ①’ | ﾃﾞｷｻｰﾄ注（3.3mg） | 6.6mg | D.I.V | 30分 |
| | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注（3mg/100mL） | 1袋 | | |

| 注意事項など | 確認者 | 監査者 |
|---|---|---|
| | | |