ID:	=患者情報!B1
患者氏名	=患者情報!B2 殿
年齢 性別	=患者情報!B6 =患者情報!B7 =患者情報!B8

（ ロンサーフ+ベバシズマブ ） 療法

施行日	クール

入院/外来		入力日		年		月		日
疾患名	治癒切除不能進行・再発の結腸・直腸癌	開始日		年		月		日
クール	4週毎/クール ・ロンサーフ:5日間投与2日間休薬 x 2回 その後14日間休薬 【 4週毎 】 ・ベバシズマブ:Day1、15	診療科					
		医師名					
適応基準	☐ 1st Line ☐ 2nd Line ☑ 3rd Line以降 ☐ 術前 ☐ 術後補助 ☑ 進行 ☑ 再発	告知の有無		P S		同意書取得	☐ 済
		身長	cm	体重	kg	体表面積	0.00 m^2

重要 B型肝炎の再活性化（de novo B型肝炎）対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

☐ HBs抗原
☐ HBs抗体
☐ HBc抗体

薬品名	単位	薬品名	単位	外来化療加算	製薬会社へのFAX登録（申請医師にて対応）※事後登録は不可
ロンサーフ配合錠 1日量:約70（1回量:約35）	☑ mg/m^2 ☐ mg/body	ベバシズマブ 5（BV）	☑ mg/kg ☐ mg/body	☑ A ☐ B ☐ 対象外	☐ 済

レジメン内容

チェック欄	医薬品名（体表面積別）	1日投与量	1回量
☐	該当する内容に☑ を入れて下さい。	ロンサーフ配合錠の規格は2種類です。（15mg規格 ・ 20mg規格）	
☐	ロンサーフ配合錠（トリフルリジン・チピラシル塩酸塩） （ ～1.07m^2未満）	70 mg/2x（朝・夕食後）	1回 35 mg
☐	〃 （1.07m^2以上～1.23m^2未満）	80 mg/2x（朝・夕食後）	1回 40 mg
☐	〃 （1.23m^2以上～1.38m^2未満）	90 mg/2x（朝・夕食後）	1回 45 mg
☐	〃 （1.38m^2以上～1.53m^2未満）	100 mg/2x（朝・夕食後）	1回 50 mg
☐	〃 （1.53m^2以上～1.69m^2未満）	110 mg/2x（朝・夕食後）	1回 55 mg
☐	〃 （1.69m^2以上～1.84m^2未満）	120 mg/2x（朝・夕食後）	1回 60 mg
☐	〃 （1.84m^2以上～1.99m^2未満）	130 mg/2x（朝・夕食後）	1回 65 mg
☐	〃 （1.99m^2以上～2.15m^2未満）	140 mg/2x（朝・夕食後）	1回 70 mg
☐	〃 （2.15m^2以上～ ）	150 mg/2x（朝・夕食後）	1回 75 mg

減量基準			減量方法
	好中球数	500/mm^3未満	①コース単位で、1日量として10mg/日単位で減量する。 ②但し、最低投与量は30mg/日までとする。 ③50mg/日の場合は朝20mg、夕30mgとする。
	血小板数	50,000/mm^3未満	

①	ベバシズマブ注 [アバスチン]	mg	D.I.V	初回 90分 2回目以降 30分 ※問題なければ時間短縮
	生食液（100mL）	100mL		

1-①							1-②							1-③							2-①				
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	・・・・・・・・・・・・	28	29	30	31	・・・
ロンサーフ	↓	↓	↓	↓	↓	×	×	↓	↓	↓	↓	↓	×	×	×			↓	↓	↓	・・・
ベバシズマブ	↓														↓			↓			

確認者	監査者

注意事項など

観察項目	1コース				2コース以降			
	1コース開始前	8日目	15日目	22日目	次コース開始前	8日目	15日目	22日目
臨床症状	◎	○	◎	◎	◎	△	◎	△
体重 *	◎	△	△	△	◎	△	△	△
PS	◎	△	△	△	◎	△	△	△
バイタルサイン/身体所見	◎	○	◎	◎	◎	△	◎	△
骨髄・肝・腎機能	◎	○	◎	◎	◎	△	◎	△

◎:必ず実施、○:可能な限り実施、△:異常所見がある場合に実施
＊:1コース開始前と比べて次コース以降の開始前の体重が10%以上減少した場合は、投与量の見直しを考慮する