

|           |  |          |                        |       |   |                                |
|-----------|--|----------|------------------------|-------|---|--------------------------------|
| ID:       | =患者情報!B1   |          | ( nab-PTX + CBDCA ) 療法 |       | 施行日   | クール                            |
| 患者氏名      | =患者情報!B2   | 殿        |                        |       |   |                                |
| 年齢 性別     | =患者情報!B6   | =患者情報!B7 | =患者情報!B8               | 入院/外来 | 入力日   | 年 月 日                          |
| 疾患名       | 非小細胞肺癌   |          |                        | 開始日   | 年 月 日   |                                |
| クール       | カルボプラチン:1週投与+2週休薬 (Day1)<br>アブラキサン :毎週投与 (Day1,8,15)<br>※アブラキサン3週連続投与を1クールとする。   |          |                        | 診療科   | 呼吸器 ( <input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科 ) |                                |
|           |  |          |                        | 医師名   |   |                                |
| <b>重要</b> | B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。<br>※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。 |          |                        |       |   | <input type="checkbox"/> HBs抗原 |
|           |  |          |                        |       |   | <input type="checkbox"/> HBs抗体 |
|           |  |          |                        |       |   | <input type="checkbox"/> HBc抗体 |

|                |  |    |                              |   |    |                |   |                |                            |                            |                         |
|----------------|--|----|------------------------------|---|----|----------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 身長             |  | cm | 体重                           |   | kg | 体表面積           | 0.00  | m <sup>2</sup> | 告知の有無                      |                            | と関連する血液製剤に同意する説明書に (必須) |
| 薬品名            |  |    | 薬品名                          |   | 単位 | 外来<br>化療<br>加算 | <input checked="" type="checkbox"/> A<br><input type="checkbox"/> B<br><input type="checkbox"/> 対象外 | P S            |                            |                            |                         |
| CBDCA<br>AUC 6 |  |    | アブラキサン 100<br>(PTX:アルブミン懸濁型) | <input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup><br><input type="checkbox"/> mg/body |    |                |   | 同意書<br>取得      | <input type="checkbox"/> 済 | <input type="checkbox"/> 済 |                         |

| レジメン内容 |  |             |                |          |
|--------|--|-------------|----------------|----------|
| 順番     | 医薬品名   | 投与量         | 投与部位           | 投与スケジュール |
| ①      | デキサート注(3.3mg)<br>アロキシ点滴静注バッグ<br>(0.75mg/50mL/袋)  | 9.9mg<br>1袋 | D.I.V<br>(メイン) | 15分      |
| ②      | アブラキサン点滴静注用<br>(パクリタキセル:アルブミン懸濁型)<br>生食液(100mL) ※<br>※残った生食液を全て抜き取り(空の点滴バッグを作成)、必要量を混注 | mg<br>100mL | D.I.V          | 30分      |
| ③      | カルボプラチン注(CBDCA)<br>生食液(250mL)  | mg<br>250mL | D.I.V          | 60分      |

**Day8 & Day15: ②のみ**

**血漿分画製剤のため、ロット番号の記録および保存が必要です。**

**調製法に注意して下さい。** ※アブラキサン点滴静注用 調製法参照  
1バイアル当たり20mLの生食液を抜き取ります。  
残った生食液を全て抜き取り(空の点滴バッグを作成)、必要量を混注して下さい。

**インラインフィルターは不要ですので、使用しないで下さい。**

|         |     |     |     |     |     |        |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
|         | 1-① | 1-② | 1-③ | 2-① | 2-② | 2-③    | 確認者 | 監査者 |
| Day     | 1   | 8   | 15  | 22  | 29  | 36 ... |     |     |
| カルボプラチン | ↓   |     |     | ↓   |     |        |     |     |
| アブラキサン  | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | ↓      |     |     |

**注意事項など**

- 【払出し～回収まで】
- ①Goが来たらアブラキサン注を棚から取り出し、管理簿へ記入+シール貼付する。 ※事前準備はしない
  - ②注射薬剤部控えにロットシールを貼り、控えをコピーする。 ※控えコピーは「血液製剤(コピー)棚へ
  - ③看護部側へは、注射薬・薬剤包装箱・ロットシールを払い出す。  
※注射薬には「実施後、ロットシールを貼り薬局へ処方せんを戻して下さい」シールを貼付する。  
(混注業務は薬剤部のため、薬剤現物の搬送は発生しないため、包装箱にロットシールを貼付して払い出す)
  - ④看護部側は投与後、注射薬にロットシールを貼付し、薬剤部へ速やかに返却する。
  - ⑤薬剤部は、実施後の注射薬が戻ってきたら、ロットシールが貼付されていることを確認し、「血液製剤(戻り)棚」に入れる。