

<h1 style="color: red; text-align: center;">癌化学療法 実施計画書</h1>		(【80kg以上・2~4コース】) ライブリバント+PEM+CBDCA) 療法				施行日	クール
		入院/外来		入力日	年	月	日
疾患名	EGFR遺伝子変異陽性の非扁平上皮性非小細胞肺癌			開始日	年	月	日
クール	ライブリバント [アミハントマフ]	3週毎投与	診療科	呼吸器 (<input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科)			
	PEM	3週毎投与		医師名			
	CBDCA	3週毎投与 ※初回投与から4コースまで投与					
重要	B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、 全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 <small>※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。</small>					<input type="checkbox"/> HBs抗原 <input type="checkbox"/> HBs抗体 <input type="checkbox"/> HBc抗体	
適応 基準	<input type="checkbox"/> 1st Line <input type="checkbox"/> 2nd Line <input type="checkbox"/> 3rd Line以降 <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 進行 <input type="checkbox"/> 再発			告知の有無	P	S	同意書取得 <input type="checkbox"/> 済
	EGFR遺伝子変異陽性		身長	cm	体重	kg	体表面積
薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外
CBDCA AUC 5	mg/m ² mg/body	PEM 500 (ヘムレキセド)	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body		mg/m ² mg/body		
薬品名	体重	2コース目	3・4コース目				
ライブリバント [アミハントマフ]	80kg以上	1750mg/body	2100mg/body				
レジメン内容							
順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール			
事前 確認	Chemo施行(特に初回) その前に以下の2項目を必ず確認すること! <input type="checkbox"/> (内服) フォリアミン錠 (5mg) 0.5mg/1x P.O.(内服) 連日服用 PEM初回投与1週間前から開始 <input type="checkbox"/> (注射) フコカル注 (500μg) 2A(1mg) i.m.(筋注) 9週間毎 PEM初回投与1週間前から開始						
	①	テキサート注 (3.3mg) 9.9mg アロキシ点 滴静注バッグ (0.75mg/50mL/袋) アロカリス点 滴静注 (235mg) 1V	D.I.V	30分			
	②	ヘムレキセド注 (PEM) [] mg 生食液 (100mL) 100 mL <small>※※PEM+生食=100mLとなるよう調製※※</small>	D.I.V	10分			
③	カルボプラチン注 (CBDCA) [] mg 生食液 (250mL) 250mL	D.I.V	60分				
Chemo初回開始1週間以上前から最終投与22日後まで <small>(1) フォリアミン錠 (5mg) 0.5mg / 1x 連日服用、(2) フコカル注 (500μg) 2A (1mg) / 回 筋注 (i.m.) 9週間毎</small>							
	レスタミン錠 (10mg)	5錠	P.O	ライブリバント投与30分前内服			
	カロナール錠 (500mg)	1錠					
ライブリバント2コース目							
④	ライブリバント [アミハントマフ] 1750 mg 生食液 (250mL) 215 mL <small>※※ライブリバント+生食=250mLとなるよう調製※※</small>	D.I.V ※CVでの投与も可	投与開始時125ml/h				
ライブリバント3・4コース目							
⑤	ライブリバント [アミハントマフ] 2100 mg 生食液 (250mL) 208 mL <small>※※ライブリバント+生食=250mLとなるよう調製※※</small>	D.I.V ※CVでの投与も可	投与開始時125ml/h				
薬剤師へ ライブリバント混注時は、インラインフィルターを使用してください。 【注意】 調整後、室温で保管する場合は10時間以内に投与を終えること。							
【投与順】 2コース目: ①→②→③→④ 3・4コース目: ①→②→③→⑤							
注意事項など							
	1Kur目	2Kur目	3Kur目	4Kur目	5Kur目	確認者	監査者
Day	1 2 8 15	22 43	64	85			
PEM	↓	↓	↓	↓			
CBDCA	↓	↓	↓	↓			
ライブリバント	↓ ↓ ↓ ↓	↓	↓	↓	↓		