

ID:	=患者情報!B1			(CDDP + GEM) 療法				施行日		クール	
患者氏名	=患者情報!B2		殿								
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来		入力日	年	月	日		
疾患名	尿路上皮癌				開始日	年	月	日			
クール		週	投与	週	休薬	診療科					
	備考	4週毎 CDDP...Day1, GEM...Day1, 8, 15			医師名						

重要 B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

HBs抗原
 HBs抗体
 HBc抗体

身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00	m ²	告知の有無	
薬品名	単位	薬品名	単位	外来化療加算		<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外	P S			
CDDP 70	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body	GEM 1000	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body				同意書取得	<input type="checkbox"/> 済		

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
Day1				
①	デキサート注 (3.3mg)	9.9mg	D.I.V	30分
	アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/袋)	1袋		
	アロカリス点滴静注235mg	1瓶		
②	硫酸Mg補正液 (1mEq/mL 20mL)	8mL	D.I.V	1時間
	ソルテム3A (500mL)	500mL		
③	ゲムシタビン注 (GEM)	mg	D.I.V	30分
	5%ブドウ糖液 (100mL)	100mL		
④	ソルテム3A (500mL)	500mL	D.I.V	1時間
⑤	マンニトール注 (300mL)	300mL	D.I.V	40分
⑥	シスプラチン注 (CDDP)	mg	D.I.V	1時間
	生食液 (500mL)	250mL		
⑦	ソルテム1 (500mL)	500mL	D.I.V	1時間

Day 2 ~ 5 デカトロン錠 (4mg) 2錠/2x (朝・昼食後)

Day8の前投薬は下記を使用すること (GEM: 軽度催吐性リスク)

⑧	デキサート注 (3.3mg)	6.6mg	D.I.V	15分
	生食液 (50mL)	50mL		

Day1 ... ①~⑦

Day8-15 ... ⑧+③

注意事項など

	1Kur目			2Kur目			確認者	監査者
	Day	1	8	15	22	29		
CDDP		↓				↓		
GEM		↓	↓	↓		↓		