

癌化学療法実施計画書

(【80kg以上・導入】 ライブリバント+PEM+CBDCA) 療法

疾患名	EGFR遺伝子変異陽性の非扁平上皮性非小細胞肺癌			開始日	年	月	日
クール	ライブリバント [アミバンタマフ]	初日,2日目,8日目,15日目	診療科	呼吸器 (<input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科)			
	PEM	初日	医師名				
	CBDCA	初日					

重要 B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

<input type="checkbox"/> HBs抗原	<input type="checkbox"/> HBs抗体	<input type="checkbox"/> HBe抗体	<input type="checkbox"/> HBe抗体
<input type="checkbox"/> 1st Line <input type="checkbox"/> 2nd Line <input type="checkbox"/> 3rd Line以降 <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 進行 <input type="checkbox"/> 再発		告知の有無	同意書取得 <input type="checkbox"/> 済
<input checked="" type="checkbox"/> EGFR遺伝子陽性		身長	cm
		体重	kg
		体表面積	0.00 m ²

薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外
CBDCA AUC 5	mg/m ² mg/body	PEM 500 (ヘムレキセド)	mg/m ² mg/body		mg/m ² mg/body		
薬品名	体重	1日目	2日目	8日目	15日目		
ライブリバント [アミバンタマフ]	80kg以上	350mg/body	1400mg/body	1750mg/body	1750mg/body		

ライブリバント注は当院未採用薬のため、「緊急医薬品使用届」の提出が別途必要です。

【投与順序】

初日: ①→②→③→④→⑤ 2日目: ④→⑥→⑦→⑧ 8日目、15日目: ④→⑨→⑩→⑪

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
事前確認	Chemo施行(特に初回) その前に以下の3項目を必ず確認すること!			
	<input type="checkbox"/> (内服) フリアミン錠 (5mg)	0.5mg/1x	P.O.(内服)	連日服用 PEM初回投与1週間前から開始
	<input type="checkbox"/> (注射) マコバル注 (500μg)	2A(1mg)	i.m.(筋注)	9週間毎 PEM初回投与1週間前から開始
	<input type="checkbox"/> (内服) テカロン錠4mg	4錠/2x	P.O.(内服)	2日間服用 ライブリバント開始前2日間服用
①	デキサート注 (3.3mg) ファモチジン注 (20mg) アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/袋) アロカリス点滴静注(235mg)	9.9mg 20mg 50mL 1V	D.I.V	30分
②	ヘムレキセド注(PEM)	mg	D.I.V	10分
	生食液(100mL)	100 mL		
※※PEM+生食=100mLとなるよう調製※※				
③	カルボプラチン注(CBDCA)	mg	D.I.V	60分
	生食液(250mL)	250mL		

Chemo初回開始1週間以上前から最終投与22日後まで
 (1)フリアミン錠(5mg) 0.5mg/1x 連日服用, (2)マコバル注(500μg) 2A(1mg)/回 筋注(i.m.) 9週間毎

★前投薬★				
④	レスタミン錠 (10mg) カロナール錠(500mg)	5錠 2錠	P.O	ライブリバント投与30分前に内服

ライブリバント初日				
⑤	ライブリバント [アミバンタマフ]	350 mg	D.I.V	投与開始時50ml/h ※Infusion reactionがない場合は、 投与開始2時間後75ml/hまで調整可能
	生食液 (250mL)	243 mL		
※※ライブリバント+生食=250mLとなるよう調製※※				

ライブリバント2日目				
⑥	デキサート注(3.3mg) ファモチジン注(20mg)	9.9mg 20mg	D.I.V	15分
	生食液 (50mL)	50mL		
⑦	生食液 (100mL)	100mL	D.I.V	30分

⑧	ライブリバント [アミバンタマフ]	1400 mg	D.I.V	投与開始時25ml/h ※Infusion reactionがない場合は、 投与開始2時間後50ml/hまで調整可能
	生食液 (250mL)	222 mL		
※※ライブリバント+生食=250mLとなるよう調製※※				

ライブリバント8日目、15日目				
⑨	デキサート注(3.3mg) ファモチジン注(20mg)	9.9mg 20mg	D.I.V	15分
	生食液 (50mL)	50mL		
⑩	生食液 (100mL)	100mL	D.I.V	30分

⑪	ライブリバント [アミバンタマフ]	1750 mg	D.I.V	8日目: 65ml/h 15日目: 85ml/h
	生食液 (250mL)	215 mL		
※※ライブリバント+生食=250mLとなるよう調製※※				

薬剤師へ
ライブリバント混注時は、インラインフィルターを使用してください。

【注意】
調整後、室温で保管する場合は10時間以内に投与を終えること。

	1Kur目		2Kur目		3Kur目	4Kur目	5Kur目	確認者	監査者
	Day	1	2	8	15	22	43		
PEM	↓					↓			
CBDCA	↓					↓			
ライブリバント	↓	↓		↓	↓	↓	↓		

注意事項など